



Grandes cultures

Le 14 Janvier 1988

n°1

CEREALES : Mouche grise - Risques faibles
TOUTES CULTURES : Attention aux campagnols
des champs

CEREALES

MOUCHE GRISE

Des prélèvements de terre pour dénombrement des oeufs de Mouche grise ont été effectués dans 6 parcelles portant des betteraves à la mi-octobre.

Une grille de risque d'origine anglaise permet de préciser le risque pour la céréale.

- Grille de risque : (Nombre d'oeufs viables à 1'ha)

. 0 - 1,25 million	Risque faible
. 1,25 - 2,5 millions	Risque moyen
. Plus de 2,5 millions	Risque fort

✱ Résultats régionaux

LOCALISATION	Nombre d'oeufs Totaux	Nombre d'oeufs Viables	Importance du risque
ESCUROLLES - 03	500 000	500 000	Faible
BARBERIER - 03	1 800 000	1 400 000	Moyen
ST-BONNET-PRES-RIOM - 63	1 462 000	954 000	Faible
TARGNAT - 63	826 000	508 000	Faible
AUTHEZAT - 63	318 000	127 000	Faible
GIGNAT - 63	508 000	318 000	Faible

Afin de préciser la relation population d'oeufs et dégâts plusieurs notations seront réalisées d'ici le printemps.

En vue des résultats, il est à noter que le risque Mouche grise est faible cette année.

up12 P1

606 47265

(1988/83)

1988. vol. 1-19

COLZA

LARVES D'ALTISE ET DE CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

★ Situation Les infestations sont très faibles.

★ Préconisations Une intervention de rattrapage à l'aide d'un oléoparathion ne se justifie pas. Les seuils suivants n'étant jamais atteints :

- * Altise : 70 % de plantes infestées.
- * Charançon : 20 % de plantes infestées.

TOUTES CULTURES

CAMPAGNOLS DES CHAMPS

★ Situation Des dégâts de campagnols des champs sont signalés dans diverses cultures de la région notamment dans le BOCAGE (03) et dans le secteur d'ISSOIRE, ANTOINGT (63).

★ Préconisations La lutte est réalisée à l'aide d'appâts empoisonnés à base de chlorophacinone.

- Appâts à préparer : 1 litre de produit commercial pour 33 kg de blé.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'orge

Spécialités : QUICK concentré, C. OPERAT, CAID, FEBOR concentrat huileux...

- Grains prêts à l'emploi : OCCI 408 mulots et campagnols, Raticide tout puissant ...

Il faut disposer les grains empoisonnés dans les trous fréquentés par les campagnols soit à la main avec des gants ou mieux avec un "fusil à souris" - Dose 15 à 20 kg/ha.

▶ Précautions

Eviter absolument : l'épandage à la volée (dangereux pour le gibier à plume).

les appâts en tas sur le sol (dangereux pour le gibier à poils).

Une lutte collective dans une même zone est toujours recommandée.

Antidote : Vitamine K1.

ATTENTION : RETENEZ LE JEUDI 25 FÉVRIER POUR PARTICIPER À LA JOURNÉE D'INFORMATION PHYTOSANITAIRE QUE NOUS ANIMERONS À L'E.N.I.T.A. DE MARMILHAT À PARTIR DE 10 HEURES.